

دليل المتبول ليلاً أثناء النوم

التبول ليلاً أثناء النوم هو حالة طبيعية.

التبول هو من الحالات الطبيعية التي تصيب كل الأطفال وهذا يظهر في مختلف الجنسيات والبلدان . التخلص من التبول أثناء النوم - يحدث عندنا (في فنلندا) في معدل عمر 42 سنه ولكن الكثير من الأطفال يتعلمون السيطرة على تبولهم بعد هذا العمر بكثير .

كل طفل من عشر اطفال ذو عمر 5-4 سنوات يتبول تقريراً بشكل مستمر أثناء امون نسبه التبول أثناء النوم عند الاطفال المبتدئين المدرسه تتراوح بين 6-8 % والمراهقين بنسبة 0,5 % في فنلندا يقدر عدد الاطفال والشباب الذين يتبولون ليلاً ويحتاجون الى علاج بمقدار 30000.

التبول أثناء النوم هو من الحالات الصعبة التي تحدث عند الطفل الخجل وتحد من علاقاته الاجتماعية. وهذا بسبب للايوين المتابع وجهد زائد . فلهذا من المهم ان تعالج حالة التبول أثناء النوم .

لماذا الطفل يبلل فراشه

لقد اعتقد الناس عن قضية التبول أثناء النوم عدة اعتقدات . فقط في العشرين سنة الاخيرة استطاعت الابحاث ان تجد اسباب هذا التبول .

التخلص من عادة التبول أثناء النوم هي عملية نمو معقدة ، التي تكون في بعض العوائل بطيئة او سريعة الزوال وفي كلتا الحالتين كل هذه العوائل سليمة. التبول أثناء النوم ليس بمرض ولكنه حالة وراثية. الاطفال الذين يتبولون أثناء النوم ليس لديهم مشاكل صحية في الكليتين او في المثانة البوليه او في المجرى البولي مثلهم مثل الاطفال العاديين.

الاطفال الذين يتبولون أثناء النوم ينامون بعمق وينهضون في الليل بصعوبه جدا . بمرور النمو عندما تمتلئ المثانة بالبول يخف النوم بشكل تدريجي مما يؤدي الى نهوض الطفل من النوم للتبول. اطفال المدارس عادة يكونون قد تعلموا النهوض أثناء النوم للتبول عند امتلاء المثانة. حالة التبول عند الاطفال تختفي عند السفر لأن النوم لا يكون عميقاً جداً مثل ما يكون في البيت.

كمية التبول عند الاطفال المتبولين ليلاً تكون كبيرة وتفوق حجم المثانة. وهذا لأن افراز الهرمون (فاسوبرسيني) يقل كثيراً ليلاً وهو الذي يساعد على تقليل افراز البول في الليل.

عند تطور النمو عند الاطفال كمية هذا الهرمون الليلي تكثر ونتيجة لها كمية البول تقل أيضاً . وفي نفس الوقت يكبر حجم المثانة. يتوقف الطفل عن تبلي فراشه ليلاً عندما تتسع المثانة لكل كمية البول الليلي.

تظهر عند العديد من الاطفال المتبولين ليلاً حاجه ملحه للتبول الكثير أثناء النهار أيضاً .
يكونون دائماً مستعجلين للذهاب الى المرافق وبيلون ملابسهم الداخلية ببعض قطرات البول. السبب بهذا هو ان المثانه غير ناضجه وعملها نشط جداً بحيث انه عندما يتجمع فيها نسبة بول قليل تسبب حاجه جديده للتبول عند هؤلاء الاطفال من الممكن أن يظهر مثل التبول الا ارادوي وهاتين الحالتين تختلفان عند تطور النمو.

التبول الليلي ليس حالة نفسيه رغم أن هذا الاعتقاد كان سائداً. الاطفال المتبولين ليلاً ينجحون في الاختبارات النفسيه مثلهم مثل الاطفال في نفس سنهم ولكن حالة التبول الليلي من الممكن أن تسبب ضعف نفسي ومشاكل اجتماعيه اذا تركت بدون معالجه. وهذه المشاكل تختلف عن اختفاء حالة التبول.

الابحاث الضرورية

أيضاً حالات التبول الليلي عند الأطفال تعتمد على المعلومات البدائية الدقيقة التي يعطوها الأهل وعلى فحص الدكتور. في هذه المعلومات البدائية يتم توضيح نسل الطفل وتطور نموه وامراضه. من المهم أيضاً توضيح نوعية التبول وكثافته وهل عند الطفل أمساك في المعدة أو التهابات في المجاري البولية. التبول الليلي الذي يظهر عند بعض العوائل تكون أعراضه نموذجية ومعروفة بحيث أن الدكتور يستطيع تشخيصه عن طريق المعلومات البدائية والفحص الطبي للطفل.

يجب عمل تحليل للبول حتى يتم التأكد من عدم وجود التهابات في المجاري البولية. فأحياناً بداية مرض السكري تسبب التبول.

في الحالات النادرة نحتاج إلى عمل فحوصات أخرى . وعند الحاجة يقوم الدكتور بعمل فحوصات إضافية للكليتين والمجاري البولية أو أي فحوصات أخرى .

توضيح حالة التبول في مركز رعاية الأطفال

يجري مركز رعاية الأطفال فحص لكل طفل يبلغ 4-5 سنين ويتم فيه توضيح موضوع التبول الليلي. من المهم أن يعرف الطفل بأنه ليس فيه عيب وإنما هو ورث من والديه قابلية التبول الليلي. حالة التبول الليلي هي حالة عاديه ومن الممكن معالجتها. عملية تقليل شرب الطفل للسوائل قبل النوم وإيقاظه للتبول في الليل لا يساعدان الطفل على تخفيف حالة التبول الليلي بل يجب استعمال الحفاظة فهي طريقة جيدة لتخفيف متاعب الأهل وفي نفس الوقت لا تسبب أبطاء معالجة الطفل. تبليل الطفل فراشه هي حالة غير أراديه ولا يجب معاقبته عليها أبداً

في هذا العمر يجب البدأ بكتابة حالة تبول الطفل في دفتر خاص (مذكرات الطفل اليوميه). تبدأ معالجة الطفل عادةً في عمر 5- سنوات.

معالجة التبول الليلي بالدواء

(دسموبرسيني) هو دواء يعمل عمل الهرمون الطبيعي (فاسوبرسيني) ولقد تم استخدام هذا الدواء في معالجة التبول الليلي لمدة 20 - سنه.

هذا الدواء يخفف كمية البول المتكونه في الليل ويخفف نوم الطفل بحيث أنه ينهمض بشكل أسهل للذهاب للحمام . الدواء يخفف عدد الليالي التي يتبول فيها الطفل في الفراش. يكون مفعول هذا الدواء أقوى عندما يكون الانتاج الهرموني الذاتي للطفل قوي.

دواء (دسموبرسيني) غير مضر بالجسم. يجب تخفيف شرب الماء أثناء الليل في وقت العلاج. حتى لا تتجمع مياه زائد في الجسم. إذا تمرض الطفل واحتاج إلى شرب الماء ليلاً يجب عندها عدمأخذ جرعة الدواء بالليل.

يحصل على دواء (دسموبرسيني) عن طريق وصفة الطبيب (راشيته) ويستخدم حسب تعليمات الطبيب. هذا الدواء موجود على شكل حبوب مجففة 60 و 120 - ميكرو غرام. معدل الجرعة البدائية لهذا الدواء هو 120- ميكرو غرام وأذا لم تنفع كمية هذه الجرعة لتخفيض تبول الطفل الليلي يمكن تزويدها إلى 180 أو 240 ميكرو غرام. يتم وضع الجبهة المجففة تحت اللسان وتذوب في لحظه بدون الحاجه إلى ماء يؤخذ هذا الدواء في المساء قبل النوم.

يتم الاستمرار بالعلاج بكمية الدواء المستخدمة حتى تنتهي حالة تبلييل الفراش. بعد ذلك نقل كمية الدواء بالتدريج حتى تنتهي الحالة بدون الدواء. من الممكن أن يستمر العلاج حتى عدة سنوات بالاعتماد على درجة النضوج. تتم مراقبة العلاج عند الطبيب بمساعدة الدفتر الخاص (مذكرات تبول الطفل اليومي).

جهاز الإنذار في علاج التبول الليلي

تبول الأطفال الليلي يمكن علاجه كذلك بواسطة جهاز للإنذار. يتكون هذا الجهاز من فراش بحجم الوسادة ومن جهاز إنذار وتكون مشكله ببعضها بواسطة أسلاك صغيرة. وكذلك توجد أجهزة إنذار أخرى تشكل في لباس الطفل. فعندما يتبلل الفراش ذو جهاز الإنذار يبدأ الجهاز بالرنين. عند العديد من الأطفال يؤدي صوت هذا الجهاز المتكرر (وتوقف التبول المؤدي إليه) بعد عدة أسابيع إلى أن الطفل يتوقف كليةً عن تبلييل الفراش حتى بدون جهاز إنذار. جهاز الإنذار هذا يأتي بنتيجة حتى ولو لم يستيقظ الطفل على صوته.

يجب استخدام جهاز الإنذار كل ليلة لمدة 2-3 أشهر. واستعماله لمدة أطول لن تأتي بنتيجه ملحوظه. إذا لم يتوقف الطفل عن تبلييل فراشه في خلال هذه المده يجب عندها إعادة العلاج بعد سنه تقريباً.

من عيوب هذا الجهاز هو أن كل العائله من ضمنها الطفل المتبول أيضاً يستيقظون على صوته. وبعض الأطفال يخافون النوم بسبب هذا الصوت. يرن هذا الجهاز أيضاً عندما يتعرق الطفل في فراشه وبهذا يكون قد أعطى وأشاره خطأه. إذا كان الطفل صغير وغير ناضج بحيث أنه يبلل فراشه عدة مرات في الليل يجب عندها استخدام طرق علاج أخرى واللجوء إلى طريقة علاج جهاز الإنذار بعد أن تكون قد قلت مرات تبول الطفل في الليل إلى مره واحدة.

طريقة العلاج المزدوج

نستطيع أن نحصل على أفضل نتائج لعلاج التبول الليلي باستخدام دواء (دسموبرسيني) و جهاز الإنذار في نفس الوقت. يبدأ العلاج عادةً بدواء (دسموبرسيني) وإذا لم يأتي هذا بنتيجه يتم استخدام جهاز الإنذار مع الدواء. إذا لم يأتي هذا أيضاً بنتيجه بعد 2-3 أشهر يتم استخدام دواء (دسموبرسيني) فقط من غير جهاز الإنذار. بعد سنه يمكن إعادة هذا العلاج المزدوج عند الحاجه.

إذا لم يتوقف التبول الليلي في وقت العلاج المزدوج حتى لبعض ليالي يتم الانتقال حينها إلى العلاج بالحافظه ويتم تجربة العلاج المزدوج بعد سنه تقريباً.

الاطفال الذين تكون حالة التبول عندهم كثيفه في الليل وكذلك في النهار نضيف الى علاجهم دواء (تولتروديني) و (أوكسيبوتونيني). هذه الادوية تزيد من مساحة المثانه البوليه وتقلل من الحاجه المستمرة للتبول. استخدام هذان الدواءان فقط لعلاج التبول الليلي يأتي بفائده قليله ولكن عند استخدامهما كجزء من العلاج المزدوج يمكن أن يؤديان الى فائد أكبر عند بعض الاطفال.

مراقبة العلاج

حتى نستطيع مراقبة تقدم مراحل العلاج وقوته يجب أن تكتب هذه المعلومات في دفتر المعلومات اليومية (دفتر علاج التبول اليومي). كل صباح نسجل في هذا الدفتر هل بلل الطفل فراشه في الليل أم لا وكذلك كل مساء نسجل هل بلل الطفل نفسه أثناء النهار أم لا وكذلك يجب كتابة طريقة العلاج المستخدمه حينها. وتم مراجعة الطبيب بشكل مستمر حتى تتوقف حالة التبول. في جلسات الطبيب هذه يتم تقييم طرق العلاج الصحيحه وكيفية الدواء التي تعطى للطفل وفيها أيضاً يتم مراقبة مدى قوة العلاج ونفعه من المعلومات المجموعه في دفتر علاج التبول اليومي وكذلك يتم مراجعة مواضيع متعلقه بالتبول.

مساعدة مالية للعناية بالطفل

نستطيع عائلة الطفل المتبول ليلاً في فراشه أن تحصل على مساعدة مالية للعناية بالطفل. شرطاً أن يكون الطفل قد تم علاجه من قبل الطبيب بسبب التبول لمدة نصف سنه على الأقل وبالرغم من العلاج المستمر، بيل الطفل فراشه عدة مرات في الأسبوع. وبحسب (دفتر مذكرات علاج التبول اليومي) تستطيع عائلة الطفل الحصول على هذه المساعدة حتى ولو أثبتت النتائج أن العلاج غير نافع وبأمر الطبيب كان قد أنتقل الطفل لعلاج الحفاظه. يكرر العلاج بعد مضي نصف سنه أو سنه على العلاج السابق. للحصول على هذه المساعدة المالية يجب الحصول من الطبيب على شهادة - سي - (الشهادة الطبية) .

من المهم التذكر

أن التبول الليلي هو حاله صعبة بالنسبة للطفل. وكلما كان عمر الطفل أكبر كلما شعر الطفل بأن الحاله أصعب وتألم أكثر منها. حالة التبول الليلي هي حاله يجب علاجها حتى لا تصيب الطفل مشاكل نفسيه أو اجتماعية.

تستطيع الحصول على معلومات إضافيه من العناوين التاليه :

www.yokastelu.net

للحجز كتب الارشاد:

info@ferring.fi

جدول مذكرات للطفل المتبول ليلاً

الاسم _____ تاريخ الولادة _____

لليل =  نهار = 

M = مبلل K = جاف T = تبليل خفيف

H/A = الجرعة/العلاج D = دسمورسيني hä = جهاز الانذار

شهر 200				شهر 200				شهر 200				شهر 200			
		T	H/A			T	H/A			T	H/A			T	H/A
1															
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															
16															
17															
18															
19															
20															
21															
22															
23															
24															
25															
26															
27															
28															
29															
30															
31															

طرق العلاج الأخرى _____